

	Direction des soins (DSO) Equipe Opérationnelle d'Hygiène (EOH)	EOH-HYG-MO-037 V6.0 Page 1/5 31 Mars 2017
	Précautions contre la transmission par Gouttelettes (PCG)	

OBJET

Description de la prise en charge d'un patient placé en Précautions Complémentaires contre la transmission par gouttelettes (PCG).

Indication

Infections bactériennes (germes sensibles ou résistants aux antibiotiques) ou virales transmissibles par les sécrétions oro-trachéo-bronchiques.

- **Patient disséminateur :**

- Patient présentant une toux fébrile récente,
- Patient non autonome avec dérivation respiratoire (type trachéostomie ou trachéotomie, intubation), avec sécrétions nécessitant des aspirations itératives par le professionnel de santé.

OU

- **Infection respiratoire bactérienne ou virale contagieuse** type adénovirus, scarlatine, rubéole, coqueluche, VRS, grippe saisonnière (type A-B-C – Nomenclature H1 ou H2 ou H3 / N1 ou N2).

Objectif des soins

Limiter la transmission croisée ou un phénomène épidémique.

DOMAINE D'APPLICATION

L'ensemble des secteurs de soins en charge des patients.

HISTORIQUE

N° Version	Nature des modifications	Date de création
01	FT/SOINS/ISOL/SEP/002	Novembre 2001
02	Réactualisation FT/SOINS/ISOL/SEP/002	Octobre 2007
03	Réactualisation FT/SOINS/ISOL/SEP/002	Octobre 2011
04	Réactualisation FT/SOINS/ISOL/SEP/002	Octobre 2014
05	Changement de codification (FT/DS/EOH/PCG) et réactualisation	Mai 2015
6.0	Réactualisation de la mise en page et de la codification (FT/DS/EOH/PCG → EOH-HYG-MO-037) selon la GED institutionnelle, autres corrections	31 Mars 2017

VALIDATION

	Rédaction	Vérification	Approbation
Nom	Danielle VELARDO	Elisabeth CHACHATY	Anne MONTARON
Fonction	Cadre coordonnateur hygiéniste	Chef du service de microbiologie, vice-président de l'EOH/CLIN	Directeur des soins
Validation électronique Traçabilité du circuit de validation sur le logiciel BMS : date, nom des intervenants et des étapes			

	Direction des soins (DSO) Equipe Opérationnelle d'Hygiène (EOH)	EOH-HYG-MO-037 V6.0 Page 2/5 31 Mars 2017
	Précautions contre la transmission par Gouttelettes (PCG)	

DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

Abréviations :

ARS : Agence Régionale de Santé
DAOM : Déchets d'Activité de Soins à Risques Infectieux
DASRI : Déchets Assimilés aux Ordures Ménagères
DM : Dispositif Médical
EOH : Equipe Opérationnelle d'Hygiène
OPCT : Objets Piquant Coupant Tranchant
PCG : Précautions Complémentaires Gouttelettes
SHA : Solution Hydro-Alcoolique
UU : Usage Unique
VRS : Virus Respiratoire Syncytial

DOCUMENTS DE REFERENCE - SOURCE

Recommandations nationales – Surveiller et Prévenir les infections associées aux soins – SF2H – Septembre 2010.

Recommandations nationales – Prévention de la transmission croisée par voie respiratoire Air ou Gouttelettes – SF2H – Mars 2013.

DOMAINE D'APPLICATION - PERSONNEL ET RESPONSABILITES

L'ensemble des professionnels de santé des unités /secteurs d'activités sous la responsabilité de leur encadrement.

MATERIEL, CONSOMMABLES ET LOCAUX

Locaux

Bionettoyage quotidien selon classification des locaux Z3 ou Z4 suivi d'une mise à blanc à la sortie du patient complétée par une désinfection par spray dirigé, type Nocolyse 12%, machine programmée à 50 m3.

Produits/Consommables

- Surfa Safe® Prenium
- SHA
- Savons doux – savon antiseptique
- Sacs déchets : DAOM – DASRI – OPCT
- Sacs hydrosolubles + sacs à linges rouges étanches

EPI

- Masque de soins type II R
- Gants non stériles
- Casaques / surblouse à UU

	Direction des soins (DSO) Equipe Opérationnelle d'Hygiène (EOH)	EOH-HYG-MO-037 V6.0 Page 3/5 31 Mars 2017
	Précautions contre la transmission par Gouttelettes (PCG)	

- Tablier plastique

HYGIENE ET SECURITE

Application des Précautions standard et PCG en complément chez les patients porteurs et/ou infectés à germe sensible ou résistant ; si celui-ci est symptomatique.

- Individualiser +++ le matériel
- Limiter le matériel qui reste dans la chambre
- Privilégier les DM à usage unique ou à patient unique.
Exemple : Brassard à tension à UU ou à patient unique
Capteur de saturation à oxygène à UU...
Dosette d'antiseptique.

DESCRIPTIF

CRITERES	MESURES A METTRE EN OEUVRE
Chambre	Chambre individuelle souhaitable, la porte peut rester ouverte selon le type de germe (avis EOHH).
Hygiène des mains Avant et après le soin	• Hygiène des mains par friction hydro alcoolique si mains visuellement propres et non souillées (SHA 3 ml). • Savon doux + SHA 3 ml si mains visuellement souillées.
Gants	• PAS DE GANTS systématique en cas de contact avec la peau saine du patient. • Port de gants non stériles pour l'ensemble des gestes à risques d'exposition au sang et aux liquides biologiques, → Leur retrait s'effectue immédiatement après le geste à risques + hygiène des mains.
Casaque	• Port d'une casaque à usage unique (les casaques en tissu sont proscrites) pour : ▫ contact direct avec le patient et/ou son environnement proche (moins de 1 m). ▫ nettoyage du matériel contaminé et manipulations linges souillés. • Une casaque à usage unique par personne et par séquence de soins.
Masque	• Port d'un masque de soins ou chirurgical (IIR). ▫ contact direct avec le patient et/ou son environnement proche (moins de 1 m). ▫ nettoyage du matériel contaminé. ▫ pour vider urines et selles. • Porter des lunettes de protections + masque IIR ou masque IIR à visière lors des gestes tussigènes : endoscopies, prélèvement respiratoire, kinésithérapie respiratoire, intubation...

	Direction des soins (DSO) Equipe Opérationnelle d'Hygiène (EOH)	EOH-HYG-MO-037 V6.0 Page 4/5 31 Mars 2017
	Précautions contre la transmission par Gouttelettes (PCG)	

Dispositifs médicaux	- Individualisation du matériel : stéthoscope, appareil à tension non invasive, flacon antiseptique etc... - Désinfection quotidien des DM de la chambre. - Désinfection par un détergent/désinfectant, avant et après utilisation, des dispositifs médicaux entrés dans la chambre : pompes, pousses seringues, saturomètre, thermomètre tympanique, appareil à tension, appareil radiographie au lit ...
Chariot de soins dans la chambre	NON dédié : utilisation du chariot de soins destinés à plusieurs patients, il entre dans la chambre préalablement nettoyé et désinfecté avant et après utilisation. - Limiter le matériel qui reste dans la chambre.
Linge	- Conditionnement du linge (sac rouge étanche + sac hydrosoluble). - Fermeture du sac dans la chambre et élimination directe par la gaine
Déchets	Trier et éliminer les déchets suivant la réglementation relative aux déchets : DASRI (sacs jaunes) : Conditionnement et fermeture du sac dans la chambre et élimination directe par le conteneur DASRI. - Déchets liquides, ex : les urines sont comptabilisées sans jamais les CONSERVER, utiliser le système clos pour les liquides gastriques et sécrétions bronchiques avec gélification. DAOM (sac noir) : Couches (sans chimio) et protections diverses, papiers, emballages, etc... - A la sortie du patient, jeter dans les DAOM les DM à usage unique qui ont été ouverts avec ou sans contact avec le patient.
Entretien des locaux et des surfaces	- Bionettoyage quotidien de l'environnement et des surfaces en insistant sur le nettoyage des surfaces proches du patient. - Entretien des DM quotidien. - A la sortie du patient, bionettoyage « mise à blanc » suivie d'une désinfection complémentaire par spray de Nocolyse® à 12%-50 m3.
Déplacements du patient	- Le patient peut quitter sa chambre : En portant un masque de soins ou chirurgical (type IIR) - Hygiène des mains par friction hydro-alcoolique seule ou lavage simple + SHA 3 ml. - Informez les services qui prennent en charge le patient pour la mise en œuvre des mesures préventives. - Informez le médecin traitant ou référent médical à la sortie du patient. INUTILE de mettre une sur blouse et des gants au patient, son hygiène des mains et ses vêtements propres sont suffisants.
Information visiteurs	- Limiter le nombre de visiteurs à 2 personnes en même temps. - Informez les visiteurs des mesures préventives : - Lavage simple des mains suivi obligatoirement d'une friction hydro alcoolique ou friction hydro alcoolique seule en entrant et en sortant de la chambre, - Port d'un masque de soins ou chirurgical (type IIR), - Port d'une casaque à usage unique. Pas de gants pour les familles sauf s'ils réalisent des soins à risques.

	Direction des soins (DSO) Equipe Opérationnelle d'Hygiène (EOH)	EOH-HYG-MO-037 V6.0 Page 5/5 31 Mars 2017
	<i>Précautions contre la transmission par Gouttelettes (PCG)</i>	

Durée des précautions	Jusqu'à la disparition de la symptomatologie clinique.
------------------------------	--

EVALUATION

Absence de transmission croisée ou de phénomène épidémique.

ANNEXES

Fiche de produit Surfa Safe Prenium®.